

## Perbedaan Kadar Interferon Gamma dan Interleukin-10 pada Orang Dewasa Terinfeksi *Ascaris Lumbricoides* dengan Tidak Terinfeksi yang Diinduksi Vaksin Bacille Calmette-Guerin

Weni Mulyani<sup>1</sup>, Nuzulia Irawati<sup>2</sup>, Netti Suharti<sup>3</sup>

### Abstrak

Kecacingan merupakan penyakit yang masih banyak di negara berkembang. Penyakit ini dapat menimbulkan gangguan gizi, pertumbuhan dan penurunan produktifitas kerja. Infeksi cacing dapat menimbulkan penurunan respon terhadap antigen sebagai akibat *modified Th2 response*. Vaksin BCG merupakan antigen yang dikenal sebagai penginduksi respon sel Th1. Tujuan penelitian ini adalah menentukan perbedaan kadar IFN- $\gamma$  dan IL-10 antara orang dewasa terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dan tidak terinfeksi yang diinduksi vaksi BCG. Penelitian dilakukan di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan menggunakan rancangan *cross sectinal study*. Populasi penelitian adalah orang dewasa kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru yang terinfeksi dan tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides*. Status kecacingan didapatkan dari pemeriksaan feses dengan metode kato-katz. Kadar IFN- $\gamma$  dan IL-10 didapatkan dengan pemeriksaan laboratorium dengan metode ELISA. Pengolahan dan analisa data menggunakan uji t. Hasil penelitian didapatkan rerata kadar IFN- $\gamma$  adalah 16,55 $\pm$ 14,13 pg/mg dan kadar IL-10 36,13 $\pm$ 8,83 pg/ml. Pada orang dewasa yang tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides* didapatkan kadar rerata IFN- $\gamma$  adalah 199,36 $\pm$ 121,86 pg/ml dan kadar IL-10 10,57 $\pm$ 9,20 pg/ml. Terdapat perbedaan bermakna kadar IFN- $\gamma$  dan IL-10 antara orang dewasa yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dengan tidak terinfeksi ( $p < 0,05$ ). Kesimpulan ialah infeksi *Ascaris lumbricoides* dapat menekan produksi IFN- $\gamma$  terhadap pemberian vaksin BCG.

**Kata Kunci:** *ascaris lumbricoides*, vaksin BCG, interferon gamma (IFN- $\gamma$ ), interleukin 10 (IL-10)

### Abstract

*Worm infestation is a disease that often occur in the develop country. This disease can makes nutrient's disturbance, growth's and low work productivity. Worm infection can also make low respond on antigen because of modified Th2 response. BCG vaccine is antigen that can induce Th1 cell respond. The objective of this study was to determine the difference between IFN- $\gamma$  and IL-10 on adult who infected *Ascaris lumbricoides* and uninfected who inducted by BCG vaccine. This cross sectinal study conducted in Muara Fajar District in Rumbai Pesisir Pekanbaru. The population were adults in Muara Fajar district Rumbai Pesisir Pekanbaru who infected and uninfected *Ascaris lumbricoides*. Worm infection was getting checked in fesses by kato-katz method. IFN- $\gamma$  and IL-10 were getting laboratory checked by ELISA method. The data was analyzed by t-test. The result of the adult who infected *Ascaris lumbricoides* showed the mean IFN- $\gamma$  is 16.55 $\pm$ 14.13 pg/mg and IL-10 36.13 $\pm$ 8.83 pg/ml. The result on adult who uninfected *Ascaris lumbricoides* showed the mean IFN- $\gamma$  is 199,36 $\pm$ 121,86 pg/ml and IL-10 10.57 $\pm$ 9.20 pg/ml. There was significant difference IFN- $\gamma$  and IL-10 between adult who infected *Ascaris lumbricoides* with uninfected ( $p < 0,05$ ). It can be concluded that infect *Ascaris lumbricoides* can pressure IFN- $\gamma$  production on given BCG vaccine.*

**Keywords:** *Ascaris lumbricoides*, BCG vaccine, Interfereon gamma (IFN- $\gamma$ ), Interleukin 10 (IL-10)

**Afiliasi penulis:** Program Studi S2 Magister Biomedik FK UNAND (Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang), 2. Bagian Parasitologi FK UNAND, 3. Bagian Mikrobiologi FK UNAND

**Korespondensi:** Weni Mulyani, email : weniaja198@yahoo.co.id, Telp: 085263607052

## PENDAHULUAN

Salah satu penyakit kecacingan adalah penyakit cacing usus yang penularannya dengan perantara tanah atau *Soil Transmitted Helminths (STH)*. Lebih dari 2 milyar orang di seluruh dunia terinfeksi oleh satu atau beberapa spesies dari *STH*.<sup>1</sup> Di Indonesia menurut Departemen Kesehatan (Depkes) 2011 prevalensi kecacingan masih relatif tinggi yaitu sebesar 32,6%, yang di dominasi oleh *Ascaris lumbricoides*.<sup>2</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar memiliki persentase infeksi yang paling tinggi, hal ini disebabkan karena perkembangan imunitas selulernya belum berkembang sempurna seperti pada orang dewasa oleh karena itu anak-anak lebih mudah terinfeksi jika dibandingkan dengan orang dewasa. Pada kenyataannya cacing dapat juga menyerang orang dewasa yang sistem imunitasnya sudah sempurna, hal ini mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan jenis pekerjaan. Penyakit ini biasanya mudah mengenai orang-orang yang bekerja di daerah kumuh dan terpapar langsung dengan tanah sehingga memberi kesempatan untuk terkena infeksi ascariasis.<sup>3</sup>

Infeksi cacing kronis akan merangsang respon sel T-helper 2 (Th2) yang kuat dan juga mendorong penekanan populasi sel T oleh T regulator (T-reg) yang dikenal dengan *modified Th2 response*. Beberapa penelitian telah membuktikan pada individu yang terinfeksi antigen spesifik cacing menunjukkan respon T helper 1 (Th1) yang rendah. T-reg memproduksi sitokin inhibitor yaitu Interleukin-10 (IL-10) yang menyebabkan *hyporesponsive* yang tidak hanya diarahkan untuk antigen cacing tetapi juga kepada antigen asing lain, seperti antigen vaksin atau patogen lainnya.<sup>4-7</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan infeksi cacing yang kronis dapat mengurangi respon imun tubuh terhadap vaksin Bacille Calmette-Guerin (BCG) sehingga mudah terinfeksi penyakit tuberculosis (TB).<sup>4</sup>

TB menginfeksi sepertiga populasi dunia dan merupakan penyakit kronis yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa TB saat ini telah menjadi ancaman global. Pada tahun

2012, diperkirakan 8,6 juta orang menderita TB dan 1,3 juta meninggal akibat penyakit ini.<sup>8</sup>

Cara yang paling efisien untuk mengendalikan TB adalah dengan penggunaan vaksin yang efektif. Vaksin yang saat ini digunakan untuk TB adalah *Mycobacterium bovis* Bacille Calmette-Guerin (BCG), tetapi disebagian daerah vaksin ini gagal memberikan perlindungan. Beberapa studi menunjukkan alasan utama keberhasilan yang rendah dari vaksin BCG disebabkan karena adanya gangguan imunitas oleh penyakit infeksi kronis yang ditandai dengan tingginya prevalensi penyakit infeksi kronis yang endemis, terutama yang disebabkan oleh cacing.<sup>9,10</sup>

Elias *et al* pada tahun 2001, menunjukkan bahwa respon sel T terhadap antigen mikobakterium tuberculosis khususnya respon sel Th1 baik sebelum dan sesudah vaksinasi BCG rendah pada subyek yang terinfeksi cacing dibandingkan dengan subyek yang tidak terinfeksi cacing.<sup>9</sup> Pada tahun 2012 Vaca *et al* menyimpulkan bahwa booster BCG secara oral tidak meningkatkan secara signifikan kadar Interferon Gamma (IFN- $\gamma$ ) pada kelompok terinfeksi *Ascaris lumbricoides* yang tidak diberi obat, tetapi pada kelompok yang diobati dengan albendazole memiliki efek signifikan terhadap respon IFN- $\gamma$ .<sup>11</sup> Data ini didukung oleh publikasi dari Gebreegziabihier *et al* (2014) yang menunjukkan adanya hubungan ibu yang terinfeksi cacing dengan peningkatan IgE total, IgG spesifik dan penurunan IFN- $\gamma$  pada darah tali pusat.<sup>12</sup> Pada tahun 2012 Mehta *et al* membuktikan bahwa bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi *STH* memiliki kadar IL-10 yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu yang tidak terinfeksi *STH*. Hal ini penting karena vaksinasi BCG saat ini sebagian besar diberikan secara langsung setelah kelahiran.<sup>13</sup>

Terlihat ada tumpang tindih antara rendahnya tingkat keberhasilan vaksin BCG dan tingginya infeksi cacing. Studi yang meneliti hubungan antara indikator infeksi cacing dan penyakit TB menunjukkan bahwa infeksi cacing dapat mengganggu imunitas terhadap mikobakteri. Perlindungan terhadap mikobakteri membutuhkan respon imun adaptive seluler yang efektif yang ditandai dengan imunitas sel Th1 yang tinggi dengan produksi sitokinnya seperti IFN- $\gamma$ , Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF- $\alpha$ ), dan Interleukin-12 (IL-

12), sedangkan infeksi cacing kronis tidak hanya dapat mengakibatkan proliferasi dan diferensiasi sel Th<sub>0</sub> menjadi Th1 dan Th2 saja, tetapi juga dapat menginduksi perkembangan sel T reg yang memproduksi IL-10 dan TGF- $\beta$  yang akan mempengaruhi penurunan respon sel Th1 dan Th2. Infeksi cacing kronis ini akan menekan respon sel Th1 yang sangat penting untuk respon imun tubuh terhadap infeksi mikobakteri dan akhirnya dapat mengurangi efektifitas vaksinasi.<sup>7,14,15</sup>

Berdasarkan *cellular hyporesponsive* yang diakibatkan oleh infeksi cacing kronis, maka perlu diteliti perbedaan kadar IFN- $\gamma$  dan IL-10 antara pada orang dewasa terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dan tidak terinfeksi yang diinduksi vaksin BCG sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan respon imun terhadap antigen vaksin BCG pada individu yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dengan individu yang tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides*.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan menggunakan rancangan *cross sectional study*. Populasi penelitian adalah orang dewasa Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru yang terinfeksi dan tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides*. Besar sampel dalam penelitian adalah 14 orang dewasa pada setiap kelompok. Pemeriksaan feses dilakukan di Laboratorium Parasitologi Akademi Analis Kesehatan Fajar Pekanbaru dan pemeriksaan sampel darah dilakukan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Variabel independen adalah orang dewasa terinfeksi dan tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dan variabel dependen adalah IFN- $\gamma$  dan IL-10.

Prosedur Kerja adalah dilakukan pemeriksaan feses pada orang dewasa untuk mendeteksi infeksi cacing, kemudian dilakukan pengambilan sampel darah 2,5 mL pada masing-masing kelompok, isolasi limfosit, penghitungan jumlah limfosit dan pengenceran, selanjutnya kultur sel limfosit, panen produk kultur dan pemeriksaan kadar IFN- $\gamma$  dan IL-10. Analisis data yang digunakan adalah uji t.

## HASIL

Variabel yang diperiksa adalah kadar IFN- $\gamma$  dan IL-10. Hasil pengukuran kadar IFN- $\gamma$  dan IL-10 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut ini :

**Tabel 1.** Perbedaan kadar rerata IFN- $\gamma$  pada orang dewasa yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dan tidak terinfeksi yang diinduksi vaksin BCG

status infeksi	ifn- $\gamma$ (pg/ml)	p
<i>ascaris lumbricoides</i>	rerata $\pm$ SD	
Terinfeksi <i>Ascaris lumbricoides</i> (+)	16,55 $\pm$ 14,13	0,000
Tidak terinfeksi <i>Ascaris lumbricoides</i> (-)	199,36 $\pm$ 121,86	

**Tabel 2.** Perbedaan kadar rerata IL-10 pada orang dewasa yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dan tidak terinfeksi yang diinduksi vaksin BCG

Status Infeksi	IL-10 (pg/ml)	p
<i>Ascaris lumbricoides</i>	rerata $\pm$ SD	
Terinfeksi <i>Ascaris lumbricoides</i> (+)	36,13 $\pm$ 8,83	0,000
Tidak terinfeksi <i>Ascaris lumbricoides</i> (-)	10,57 $\pm$ 9,20	

## PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 1, didapatkan bahwa rata-rata kadar IFN- $\gamma$  pada orang dewasa yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* yaitu 16,55  $\pm$  14,13 pg/ml, sedangkan rata-rata kadar IFN- $\gamma$  pada orang dewasa yang tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides* yaitu 199,36  $\pm$  121,86 pg/ml, dengan nilai  $p < 0,005$  (0,00), artinya terdapat perbedaan bermakna kadar IFN- $\gamma$  antara orang dewasa yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dan orang dewasa yang tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides*.

Kelompok perlakuan yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* mempunyai kadar IFN- $\gamma$  yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides*. Hal ini disebabkan karena selama infeksi cacing kronis, sebenarnya sistem imun hospes mengenali antigen asing lain tetapi terhambat oleh aktivasi supresi atau mekanisme regulator. T reg yang dihasilkan selama infeksi cacing kronis akan mengekspresikan dan

melepaskan IL-10 yang diduga petanda supresif, yang akan mempengaruhi penurunan respon sel Th1 dan sel Th2, dengan demikian infeksi cacing kronis ini akan menekan respon sel Th1 untuk menghasilkan IFN- $\gamma$ .<sup>7,15-17</sup>

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan tahun 2014 oleh Gebreegiabiher *et al* melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ibu yang terinfeksi cacing usus terhadap fungsi imunitas tubuh ibu dan bayi dalam menanggapi tuberkulosis. Gebreegiabiher *et al* menyimpulkan bahwa kadar IFN- $\gamma$  secara signifikan lebih rendah pada subyek yang terinfeksi cacing usus dibandingkan dengan subyek yang tidak terinfeksi cacing usus. Hal ini disebabkan karena peningkatan aktivitas sel T reg yang bertanggung jawab untuk antigen tertentu yang diamati selama infeksi cacing kronis.<sup>12</sup>

Vaca *et al* pada tahun 2012 melakukan penelitian terhadap efek infeksi *Ascaris lumbricoides* pada respon imun terhadap booster BCG secara oral. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa booster BCG oral tidak meningkatkan secara signifikan kadar IFN- $\gamma$  sesudah vaksinasi pada anak terinfeksi *Ascaris lumbricoides* yang tidak diberi obat (albendazole), kegagalan ini memberikan bukti bahwa ada penghalang imunologis mukosa pada vaksinasi secara oral dan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk keberhasilan imunisasi ini adalah dengan meningkatkan kesehatan mukosa, diantaranya dengan memberikan pengobatan obat cacing sebelum vaksinasi.<sup>11</sup>

Pada tahun 2001 Elias *et al* juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh respon sel T pada manusia terhadap antigen mikobakteri pada individu yang terinfeksi cacing sebelum dan sesudah vaksinasi BCG. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kelompok yang diobati dengan albendazole setelah vaksinasi menghasilkan jumlah IFN- $\gamma$  yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan prevaksinasi ( $p=0,03$ ) sedangkan, pada kelompok plasebo perbedaannya tidak signifikan. Elias *et al* menyimpulkan bahwa respon sel T terhadap antigen mikobakteri tuberkulosis khususnya respon sel Th1 baik sebelum dan sesudah vaksinasi BCG rendah pada subyek yang terinfeksi cacing.<sup>9</sup>

Pada tahun 2008 Elias *et al* kembali melakukan penelitian dengan merekrut relawan yang tidak terinfeksi mikobakteri sebelumnya dan yang terinfeksi cacing usus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) yang diperoleh dari kelompok plasebo memiliki frekuensi IFN- $\gamma$  yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang diberi obat anti cacing (129 vs 191,  $p = 0,03$ ) ketika distimulasi secara invitro dengan antigen mikobakteri, ini menunjukkan bahwa infeksi cacing mengganggu imunogenisitas vaksinasi BCG yang diukur dengan produksi sitokin yang merespon antigen spesifik TB yaitu IFN- $\gamma$ , ini mendukung pandangan bahwa terapi anti cacing dari populasi yang terinfeksi cacing diperlukan untuk meningkatkan efektivitas BCG di negara-negara endemik cacing di daerah tropis.<sup>18</sup>

Elias *et al* menyimpulkan bahwa pengobatan infeksi cacing selama vaksinasi BCG dapat meningkatkan secara signifikan proliferasi dan respon IFN- $\gamma$  terhadap mikobakteri tuberkulosis, implikasinya adalah bahwa paparan cacing usus selama vaksinasi BCG dapat berkontribusi pada penurunan respon sel T terhadap antigen mikobakteri.<sup>18</sup>

Implikasi dari hal ini adalah bahwa individu yang terinfeksi cacing kronis mungkin memiliki peningkatan kerentanan terhadap infeksi yang biasanya direspon oleh immunity sel Th1 dan infeksi cacing ini juga dapat mengubah respon imun untuk vaksin yang berpotensi diarahkan terhadap infeksi intraseluler menjadi menurun.<sup>19</sup>

Berdasarkan Tabel 2, didapatkan bahwa rata-rata kadar IL-10 pada orang dewasa yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* yaitu  $36,13 \pm 8,83$  pg/ml, sedangkan pada orang dewasa yang tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides* yaitu  $10,57 \pm 9,20$  pg/ml, dengan  $p < 0,05$  (0,00), artinya terdapat perbedaan bermakna kadar IL-10 antara orang dewasa yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dengan orang dewasa yang tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides*. Dari hasil penelitian ini menunjukkan kelompok perlakuan yang terinfeksi *Ascaris lumbricoides* mempunyai kadar IL-10 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak terinfeksi *Ascaris lumbricoides*.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa infeksi cacing berhubungan dengan sel T-reg

yang ditandai dengan peningkatan ekspresi IL-10.<sup>20,21</sup> T-reg awalnya dianggap untuk mengatur toleransi terhadap antigen diri, tetapi populasi sel T yang sama kini telah terbukti terlibat dalam respon terhadap antigen eksogen termasuk bakteri. Studi lain juga menunjukkan bahwa T-reg yang dihasilkan selama infeksi cacing dapat mempengaruhi respon imun terhadap vaksinasi.<sup>18</sup>

Pada tahun 2010 Figueiredo *et al* melakukan penelitian untuk melihat efek dari infeksi kronis cacing usus terhadap produksi sitokin Th1, Th2, T reg dan produksi antibodi IgE dan IgG4 pada anak yang tinggal di daerah miskin kota. Hasil penelitian yang diperoleh adalah produksi IL-10 lebih tinggi pada anak yang terinfeksi dengan cacing usus daripada anak yang tidak terinfeksi ( $P < 0,001$ ). Figueiredo *et al* menyimpulkan bahwa infeksi cacing usus menghasilkan efek homeostatis melalui produksi IL-10 dengan menekan produksi sitokin lainnya terutama selama infeksi kronis.<sup>22</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mehta *et al* pada 2012 terhadap kadar IL-10 pada anak usia 13-18 bulan dengan ibu yang terinfeksi *STH* sebelumnya dibandingkan dengan ibu yang tidak terinfeksi selama kehamilan. Bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi memiliki kadar IL-10 yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak terinfeksi ( $P = 0,033$ ). Mehta *et al* menyimpulkan bahwa peningkatan produksi IL-10 adalah gambaran dari infeksi cacing kronis. Peningkatan ini memiliki efek penting dalam modulasi respon inflamasi yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi lainnya seperti dapat mengubah respon imun untuk TB.<sup>13</sup>

Resende *et al* pada tahun 2006 juga melakukan penelitian untuk melihat dampak infeksi cacing usus pada respon anti TB pada pasien TB dan pasien TB bersamaan dengan infeksi cacing usus (TB + cacing). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infeksi cacing usus pada pasien TB memiliki dampak negatif, pada awal pengobatan, frekuensi IFN- $\gamma$  secara signifikan lebih rendah pada pasien TB+cacing dan pada akhir pengobatan IFN- $\gamma$  juga tetap lebih rendah pada pasien TB+cacing dibandingkan pasien TB. Menariknya, frekuensi IL-10 tidak berbeda secara signifikan pada pasien TB dan TB+cacing pada awal

pengobatan, namun pada akhir pengobatan IL-10 menurun secara signifikan pada pasien TB tetapi tetap tinggi pada pasien TB+cacing.<sup>23</sup>

Resende *et al* menyimpulkan pada akhir pengobatan TB, produksi IFN- $\gamma$  yang rendah mungkin akibat dari produksi IL-10 yang tinggi. Infeksi cacing usus dapat menginduksi produksi IL-10 yang tinggi dan juga berperan pada supresi imun terhadap TB aktif. Pasien TB yang disertai infeksi cacing menunjukkan perubahan distribusi subset sel T dan peningkatan IL-10 dibandingkan dengan pasien TB yang tidak terinfeksi cacing. Diagnosis dan pengobatan cacing usus mungkin penting untuk respon yang sukses terhadap pengobatan TB, ini sangat penting untuk keberhasilan dari upaya global untuk mengendalikan TB.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas, telah menjadi semakin jelas bahwa infeksi cacing selain merangsang respon sel Th2 yang kuat, juga menginduksi populasi sel T supresive yang dikenal sebagai sel T-reg.<sup>24</sup> Mahanty *et al* (1997) dan King *et al* (1993) menunjukkan bahwa terdapat sel-sel spesifik antigen cacing yang tinggi dan respon sel Th1 yang rendah pada orang yang terinfeksi cacing dan reaktivitas mereka dapat kembali dengan adanya antibodi yang menetralkan sitokin regulator IL-10 dan TGF- $\beta$ . Hal ini dilaporkan dan menjadi bukti peningkatan aktivitas sel T reg selama infeksi cacing kronis.<sup>25,26</sup>

Sel T reg menghasilkan sitokin inhibitor (IL-10, TGF- $\beta$ ) yang dapat menekan respon inflamasi. Perubahan dalam respon imun yang disebabkan oleh infeksi cacing kronis dapat berdampak pada kemampuan host untuk mengatasi infeksi yang tidak terkait lainnya seperti TB. Bukti lain dampak cacingan pada respon terhadap mikobakteri juga dilakukan oleh Elias *et al* (2001) di Ethiopia yang membuktikan bahwa individu yang terinfeksi cacing memiliki respon seluler terhadap antigen spesifik TB yang rendah dan produksi sitokin inhibitor yang lebih tinggi dibanding individu yang tidak terinfeksi cacing.<sup>9</sup>

## KESIMPULAN

Terdapat perbedaan kadar IFN- $\gamma$  pada orang dewasa terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dengan tidak terinfeksi yang diinduksi vaksin BCG.

Terdapat perbedaan kadar IL-10 pada orang dewasa terinfeksi *Ascaris lumbricoides* dengan tidak terinfeksi yang diinduksi vaksin BCG.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kepala Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dan Kepala Laboratorium Akademi Analisis Kesehatan Fajar Pekanbaru sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization. Soil transmitted helminthiasis. 2012.
2. Departemen Kesehatan RI. Profil kesehatan Indonesia 2009. Jakarta: Pusat Data dan Informasi; 2011.
3. Ikhsan A. Hubungan perilaku higiene dan status gizi dengan infestasi soil transmitted helminth pada murid SDN 008 Sukaping Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Sengingi. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau; 2012.
4. Elias D, Akuffo H, Britton S. Helminth could influence the outcome of vaccines against TB in the tropics. *Parasite Immunol.* 2006;28:507-13.
5. Smits H, Hermelijn, Everts Bare, C Franca Hartgers, Yazdanbakhsh. Chronic helminth infection protect against allergic diseases by active regulatory processes. *Curr Allergy Asthma Rep.* 2010;10:3-12.
6. Mendez P, Samperio. Immunological mechanisms by which concomitant helminth infections predispose to the development of human tuberculosis. *Korean J Parasitol.* 2012;4:281-6.
7. Nel Hendrik J, Plessis Nelita, Kleynhans L, Loxton AG, Helden PDV, Walzl G. Mycobacterium Bovis BCG infection severely delays *trichuris muris* expulsion and co-infection suppresses immune responsiveness to both pathogens. *BMC Microbiology.* 2014;14(9): 1471-2180.
8. World Health Organization. Global tuberculosis report; 2013.
9. Elias D, Wolda D, Akuffo H, Petros B, Broner U, Britton S. Effect of Deworming on human T cell responses to mycobacterial antigens in helminth-exposed individuals before and after bacille calmette-guerin (BCG) vaccination. *Clin Exp Immunol.* 2001;123:219-25.
10. Workineh M, Mathewos B, Tekeste Z. Effect of helminths on immunity, clinical response and vaccination against tuberculosis. *Advanced Journal of Biological Research.* 2013;1(002):013-21.
11. Vaca M, Moncayo AL, Cosgrove AC, Chico EM, Branco LR, Castello LDJ, et al. A single dose of oral BCG Moreau fails to tuberculin in children in the rural tropics: evidence for a barrier to mucosal immunization. *Journal of Tropical Medicine.* 2012; 10(1555).
12. Gebreegziabher D, Desta K, Desalegn G, Howe R, Abebe M. The Effect of maternal helminth infection on maternal and neonatal immune function and immune to tuberculosis. *Plos One.* 2014;9(4): e93429.
13. Mehta Raaj S, Rodriguez AI, Chico, Martha, Guadalupe I, Brancano N, Sandoval C, et al. Maternal geohelminth infections are associated with an increased susceptibility to geohelminth infection in children: a case-control study. *Plos Neglected Tropical Diseases.* 2012;6(7):e1753.
14. Maizels RM, Yazdanbakhsh. Immune regulation by helminth parasites: cellular and molecular mechanism. *Nature Review Immunologi.* 2003;3: 733-44.
15. Soelen N van, Mandalakas AM, Kirchner HL, Walzl G, Grewal HMs, Jacobsen Marc, et al. Effect of ascaris lumbricoides specific IgE on tuberculin skin test responses in children in a high-burden-setting: a cross-sectional community-based study. *BMC Infectious diseases.* 2012;12(211):1471-2334.
16. Maizels RM, Balic A, Escobar NG, Nair M, Taylor MD, Allen JE. Helminth parasites—master of regulation. *immunological reviews.* 2004;201:89-116.
17. Darwin E. *Imunologi dan infeksi.* Padang: Andalas University Press; 2000.
18. Elias D, Britton S, Aseffa A, Engers H, Akuffo H. Poor immunogenicity of BCG in helminth infected population is associated with increased in vitro TGF- $\beta$  production. *Vaccine.* 2008;26:3897-902.
19. Raviglione MC, Snider DE Jr, Kochi A. Global epidemiology of tuberculosis. morbidity and

- mortality of a worldwide epidemic. *JAMA*. 1995;273(3):220-6.
20. Leng Q, Bentwich Z, Borkow G. Increased TGF-beta, Cbl-b and CTLA-4 Levels and immunosuppression in association with chronic immune activation. *Int Immunol*. 2006;18:637-44.
  21. Babu S, Blauvelt CP, Kumaraswami V, Nutman TB. Regulatory networks induced by live parasites impair both Th1 and Th2 pathways in patent lymphatic filariasis: implications for parasite persistence. *J Immunol*. 2006;176:3248-56.
  22. Figueiredo CA, Barreto ML, Rodrigues LC, Cooper PJ, Silva NB, Amorim LD, *et al*. Chronic intestinal helminth infections are associated with immune hyporesponsiveness and induction of a regulatory network. *Infection and Immunity*. 2010;78(7):3160-7.
  23. Resende Co T, Hirsch CS, Toossi Z, Dietze R, Ribeiro - Rodrigues R. Intestinal helminth co-infection has a negative impact on both anti-mycobacterium tuberculosis immunity and clinical response to tuberculosis therapy. *Clin Exp Immunol*. 2006;147:45-52.
  24. Belkaid Y, Rouse BT. Natural regulatory T cells in infectious disease. *Nat Immunol*. 2005;6:353-60.
  25. Mahanty S, Mollis SN, Ravichandran M, Abrams JS, Kumaraswami V, Jayaraman K. High levels of spontaneous and parasite antigen-driven interleukin-10 production are associated with antigen-specific hyporesponsiveness in human lymphatic filariasis. *J Infect Dis*. 1996;173:769-73.
  26. King CL, Mahanty S, Kumaraswami V. Cytokine control of parasite-specific anergy in human lymphatic filariasis. preferential induction of a regulatory t helper type 2 lymphocyte subset. *J Clin Invest*. 1993;92:1667-73.